MUSTER ABLAUF

AMBULANTES MANAGEMENT BEI VIRUSINFEKTION ERWACHSENER

In Zeiten der Corona-Epidemie

Verdacht auf Atemwegsinfekt?

NEIN → Möglichst **telefonische Klärung**; Praxisbesuch, nur wenn unbedingt nötig

JA ↓

Fieber oder schwere Krankheitssymptome?

NEIN → **Ambulante Betreuung zuhause**, ggf. Isolation

Weitere Hilfe nötig (versorgende Angehörige, Pflege, Hilfsmittel)? → **NEIN** → A und B NEIN

JA ↓

A) Entweder mindestens 1 von:
- Atemfrequenz > 25/Min.
- schwere Atemnot
- O_2-Sättigung < 93 %

B) oder mindestens 1 von (**fett** = qSOFA)
- **RR < 100 mmHg**
- Puls > 99/Min
- **Atemfrequenz > 25/Min**
- Fieber (> 38,3 °C) oder Unterkühlung (< 36 °C)
- Schüttelfrost
- **Plötzliche Bewusstseinseintrübung (GCS < 15)**

JA → **V.a. schwere Pneumonie** ☛ **Klinik-einweisung**

JA → **V.a. Sepsis** ☛ **Klinik-einweisung**

A und B NEIN ↓

Liegen weitere Risikofaktoren vor?
- Alter > 65 Jahre
- **Hypertonie**
- **Diabetes mellitus**
- Herzschwäche
- Asthma
- COPD
- Immunsuppression
- Wohnt allein

JA ↓

Isolation zuhause, nur wenn es die körperliche Verfassung und das Umfeld zulassen

Telefonische Rückmeldung am nächsten Tag vereinbaren

Entlassung aus Quarantäne nach nur häuslicher Isolation:
14 Tage nach Symptombeginn,
> 2 Tage beschwerdefrei

Stand: 24.3.20 **Erstellt von:** J. Dielmann-von Berg, Dr. H.-M. Mühlenfeld
Quellen: WHO Clinical managment of SARI when COVID-19 is detected, deximed

GEPRÜFTE FORTBILDUNG FÜR DEN HAUSARZT GEEIGNET IHF
DER Hausarzt